

Вестник информационно-консультационной службы

Лекарственные растения в птицеводстве

Лекарственные растения находят все более широкое распространение в качестве эффективных подкормок и применяются в лечебно-профилактических целях в приусадебном птицеводстве. Использование листьев, цветов, корней, личиных лекарственных растений, встречающихся как в диком, так и в культурном виде, исключает назначение дорогостоящих синтетических ветеринарных препаратов, в частности антибиотиков, способствует сохранению поголовья выращиваемой птицы и позволяет получить продукцию, свободную от остаточных количеств вредных для здоровья людей веществ.

Лекарственные растения, заготовленные в период наибольшего содержания в них биологически активных веществ, рекомендуется использовать для кур цыплят в форме настоев, отваров или порошков, которые в необходимой дозе (в перерасчете на имеющееся на подворье поголовье), следует смешать с небольшим количеством корма и дать в утреннее кормление. При 2-3-разовом назначении лекарственных трав готовят также влажные мешанки, которые раздают в начале кормления.

Валериана лекарственная. В птицеводстве используют корень и корневище как успокаивающее средство. Заготовку сырья проводят осенью в фазе плодоношения. Промытые в воде корни вначале 3-5 ч выдерживают в тени (подвешивают), а затем сушат при температуре 25-30 °С. В аптеке можно приобрести брикеты высушенной валерианы. Используют в форме настоя (1:30) в дозе 0,2-0,5 мл на взрослую курицу.



Василек синий. Улучшает пищеварение, обладает легким мочегонным и желчегонным эффектом, ускоряет заживление ран. Собирают в период полного цветения краевые воронковидные лепестки, сушат разложенными на бумаге в темном с хорошей вентиляцией помещении.

Используют в виде настоя (1:10) по 2-3 мл; на раны, царапины накладывают измельченные лепестки.

Вахта трехлистная (трехлистник водяной). Улучшает пищеварение, возбуждает аппетит, используется как

противоглистное средство. Заготавливают после цветения (июнь — сентябрь) листья с короткой, около 3 см, частью черешка, проявляя на открытом воздухе и досушивают под навесом или в сушилке при температуре до 60 °С.

Назначают внутрь в форме настоев (1:10) по 2-5 мл.

Зверобой. В народной ветеринарии употребляют при поносах как желчегонное средство, а также для заживления ран, царапин. Сырье собирают в период цветения, подрезая растение на 25-30 см, сушат в пучках, подвешенных в тени. Аптеки продают траву зверобоя в брикетах.

С лечебной целью используют настой (1:10—1:20) внутрь в дозе по 1-2 мл 2-3 раза в сутки.

Клевер луговой применяется как витаминный корм, содержащий витамины группы В, С, Е, каротин — провитамин А. Собирают листья до цветения или соцветия (шаровидные головки) в период цветения, сушат в тени.

С лечебно-профилактической целью рекомендуется отвар головок клевера (1:20), который готовят на кипящей водяной бане (кастрюле с кипящей водой), в которую ставят эмалированную кастрюльку и при частом помешивании выдерживают до 30 мин, затем охлаждают 10—15 мин и процеживают через 2 слоя марли.

При заболеваниях дыхательных путей дают по 2-5 мл отвара несколько раз в день.

Кориандр посевной. Рекомендуют в качестве средства, улучшающего пищеварение, обладающего противомикробными свойствами. Собирают растения после полного созревания плодов (начинают буреть), срезая серпом, связывают пучками и высушивают, затем обмолачивают. Используют для кур по 0,2—0,5 г плодов в виде порошка с кормом.

Крапива двудомная. Применяется при выращивании птицы в качестве витаминного корма. В листьях содержатся витамины С (в значительно большем количестве, чем в черной смородине), каротин (больше по сравнению с морковью), много полезных органических кислот, соли железа. Заготавливают листья крапивы во время цветения (обрывают руками в перчатках), сушат под навесами, в сараях, на чердаках.

Применяют внутрь для лечения и профилактики гиповитаминозов в форме настоя из сухих листьев (1:20) по 3-10 мл 3 раза в день.

Лен посевной. Используют при воспалительных процессах органов дыхания и желудочно-кишечного тракта. Лечебным действием обладают семена льна, которые можно приобрести в аптеках и магазинах.

Применяют для кур в форме слизи:

1 часть семян заливают 30 частями горячей воды, взбалтывают и настаивают 30 мин. Доза — 5—20 мл.

Лук медвежий (дикий чеснок). Рекомендуют в качестве витаминной подкормки и как средство, улучшающее пищеварение. Заготавливают цветочные стрелки вместе с луковичками и молодыми листьями до начала цветения.

В птицеводческой практике используют настои (1:20) дозе 1-5 мл.

Лук репчатый. Богат витаминами С, В, каротином; обладает антибактериальным действием, улучшает аппетит и пищеварение.

Используют в виде настоя на предварительно прокипяченной воде: 1 часть приготовленной на терке кашицы лука и 10 частей воды смешивают в бутылке с закрытой пробкой; доза 1-3 мл 2-3 раза в день.

Из луковичной шелухи готовят 5%-ный отвар, который дают по 3-5 мл.

Мать-и-мачеха. Применяется в народной ветеринарии (при заболеваниях желудочно-кишечного тракта и органов дыхания; листья содержат аскорбиновую кислоту (витамин С), каротин, микроэлементы. Заготавливают прикорневые листья в первой половине лета и быстро сушат. Настои дают (1:10) внутрь в дозе 0,5 - 1 мл.



Одуванчик лекарственный. Содержит большое количество витаминов С, В, РР, каротин, соли железа, марганца, кальция, фосфора. В птицеводстве используется в качестве подкормки и как средство, регулирующее деятельность желудочно-кишечного тракта. Заготавливаются листья в период цветения, корни — поздней осенью.

С лечебно-профилактической целью назначают отвар из корней или настой из листьев (1:10) по 2-10 мл 2-3 раза в день.

Папоротник мужской. В птицеводческой практике используется корневище в качестве противоглистного препарата. Заготавливают корневища осенью или ранней весной, промывают водой и сушат.

С лечебно-профилактической целью назначают порошок корневища внутрь в дозе 0,2—1 г.



Подорожник большой. Богат витаминами С, К, группы В, каротином, органическими кислотами. Используется в качестве средства, регулирующего функцию желудочно-кишечного тракта. Собирают хорошо развитые листья подорожника. Начиная с июня, в течение всего лета, высушивают; сухие листья сохраняют полезные свойства до 3-х лет.

Птице добавляют в корм в виде настоя (1:20) по 0,1-0,2 мл.

Подсолнечник однолетний. Цветы, листья и семена содержат разнообразные вещества, оказывающие благотворное действие на организм птицы. В практике широко применяется подсолнечное масло при закупорке зоба, засорении желудка, как легкое слабительное средство внутрь по 2—5 мл.

Сосна лесная. Используют почки и хвою. Почки богаты витаминами С и К, минеральными солями. В хвое содержатся витамины К, группы В, в большом количестве — С, фитонциды. Сосновые почки обладают дезинфицирующим действием, заготавливают их ранней весной в начале набухания. Хвою применяют при гиповитаминозах, ее можно собирать круглый год, но лучше всего зимой.

Птице дают в виде настоя (1:10) по 1-2 мл.

Тыква обыкновенная. Рекомендуются к использованию как легкое слабительное и противоглистное средство.

Птице назначают высушенные семена, предварительно растерев их с водой в ступке, во влажной мешанке в дозе 20 г.

Тмин обыкновенный. Используются в качестве антисептического, желчегонного и легкого слабительного средства. Сырье собирают в период плодоношения; растения срезают и связывают в пучки для просушки, затем обмолачивают.

Для птиц применяют семена в виде порошков внутрь по 0,2-0,5 г 2-3 раза в день с кормом.

Укроп огородный. В свежем виде используют как витаминный корм, плоды (семена) — для улучшения аппетита, при воспалительных заболеваниях дыхательных путей и желудочно-кишечного тракта.

Высушенные семена в виде порошка по 0,2-0,5 птице дают с кормом.

Источник: <http://phpushkinskoe.ru>

Вздутие живота у кроликов. ЖКС — безмолвный убийца.



Сегодня мы поговорим об очень опасном и довольно распространенном заболевании кроликов, которое связано с особенностью их пищеварения. Я имею в виду вздутие живота животного, вследствие остановки работы кишечника. В ветеринарии эти симптомы часто дают основание диагностировать такую болезнь как желудочно — кишечный стаз или сокращенно ЖКС. Последствия его самые скоротечные и печальные. Вчера ещё ваш питомец был активен, бодро прыгал и ел с аппетитом, а сегодня на глазах умирает с раздутым, как футбольный мяч животом, страдая от сильной боли. В это же время другие его собратья как ни в чём не бывало продолжают здоровствовать. Иногда метеоризм и вздутие принимают массовый характер, что влечёт за собой большие убытки. Можно ли избежать такого поворота событий, а при необходимости принять эффективные меры?

Что такое ЖКС и почему он наступает?

Система пищеварения кролика считается самой несовершенной в его организме и имеет некоторые особенности. Так в отличие от других животных, желудок нашего «зайчика» не обладает мускулатурой для сокращения своих стенок. Пища по кишечнику движется под воздействием давления

вновь проглатываемого корма. Даже небольшая закупорка или почему-либо возникший спазм может привести к полной остановке всего процесса — стазу. (Stasis по гречески — застой, остановка физиологического содержания в просвете какого-либо трубчатого органа.)

Признаки болезни: Скопывающиеся газы в желудке начинают его раздувать, вызывать боль, которая угнетает кролика. Он перестаёт есть, пить, перестаёт двигаться, через какое-то время падает и лежит, выпучив глаза. Само по себе голодание приводит к потере сил и сопротивляемости. От этого часто температура тела его падает, это вызывает дрожь. Уже примерно через несколько часов кролик настолько измучен и обессилен, что не в состоянии бороться за свою жизнь. Как сопутствующее явление при ЖКС, наблюдают нарушение в работе печени, что ещё больше усугубляет ситуацию. Опытный кроликовод даже без участия ветеринара может определить кишечный стаз по отсутствию кала в течение 10-12 часов, вялому поведению (часто прячется в угол), отказу от пищи, вздутию живота, снижению температуры тела ниже 37°C, частому дыханию и характерному скрежету зубов. Ветеринар дополнительно может при помощи прослушивания и рентгена определить место закупорки, область скопления газов и точнее назначить метод лечения. Это может быть катетер, клизма, лекарства, массаж живота. Чем раньше начать лечение, тем вероятность выздоровления выше.

Какие же кролики попадают в зону риска заболеть ЖКС?

Сразу оговорюсь, что в данной статье не буду рассматривать вздутия, вызываемые болезнетворными организмами, такими, как кокцидии. Это совсем другая, хотя и весьма распространённая история, но в этом случае заболевание лечится иначе. Поэтому очень важно хорошо знать признаки

коксидиоза.

Возможные причины: Первопричиной ЖКС, так же как и при ряде других болезней может стать стресс животного. Под стрессом нужно понимать любые изменения в привычном образе жизни питомца. Например, выход из гнезда, смена вида кормов, изменение погодных условий, испуг, перевозка на длительное расстояние и т.д.

Особо отмечу первую причину. Замечено, что вздутию живота наиболее подвержены кролики в молодом возрасте, чаще при окончании подсосного периода. Тут сказывается сразу несколько факторов. Во-первых, это переход с молока на обычный корм (сено, зерно, мешанки...). Во-вторых, недостаточная ещё кислотность желудка. В-третьих, частое попадание в желудок шерсти из гнезда, которая далее собирается в клубок и становится своеобразным тромбом, намертво закупоривает кишечник.

Часто ЖКС возникает от неправильного кормления или использования недоброкачественных кормов. Например, дикие кролики всегда предпочитают обгрызать наиболее молодые и мягкие верхушки растительности, используют грубую часть растений лишь для стачивания зубов. Домашние же питомцы часто не имеют выбора и вынуждены поглощать то, что им дают. Это приводит к повышенной нагрузке на желудочно-кишечный тракт, особенно молодых особей, застою и началу брожения. И наоборот, после перехода на весеннюю травку без постепенного приучивания или при раздаче мокрой травы (дождь, роса), кролик в лучшем случае запоносит, а в худшем начнёт раздуваться. Проверяйте так же траву на отсутствие ядовитых её видов.

Старайтесь ограничивать приращение кормов, которые по своей сути являются тяжёлыми для переваривания или вызывают повышенное газообразование в желудке и кишеч-

нике. К ним относятся капуста, бобы, сено люцерны или корма с её добавками, свекольная не подвяленная ботва, замороженные овощи или силос и др. Отдельно хочу предостеречь об опасности скормливания кроликам свежескошенной травы, которая какое-то время находилась в валках (в скупенном виде) и успела разогреться под воздействием гнилостных бактерий. Это же касается неправильно приготовленного, забродившего силоса.

В последнее время в продаже появились крупы быстрого приготовления, которые не требуют обычной варки. Их достаточно на пять минут залить кипятком. Скармливание подобных «ноу-хау» в сухом виде кролику неизбежно приведёт к разбуханию в желудке и кишечнике и тогда всё...

Явления застоя пищи чаще наблюдаются у кроликов с малой подвижностью. Наоборот активные передвижения способствуют улучшению моторики кишечника. Если у вас тесные клетки или не соблюдены санитарные нормы размещения животных (перенаселение), старайтесь периодически выпускать своих кроликов на свободу, чтобы они какое-то время проявляли активность. Конечно, нужно принять меры от употребления некачественной пищи с открытой местности, защите от собак и т.д. Если есть возможность, соорудите небольшую вольер для выгула своих кроликов. Некоторые кролиководы с успехом используют обычную яму для временного (и не только) пристанища в период массового увеличения поголовья. Постоянно контролируйте качество кормов. Сено или трава, содержащие пестициды или другие химикаты губительны для животных. Если у вас есть даже малейшее подозрение на их присутствие, откажитесь от таких кормов. Во многих случаях причиной ЖКС стало сено, содержащее плесень или её споры, которые даже не видны обычным глазом. Обычно некачественное сено можно определить по характерному неприятному запаху. Если же плесень явно просматривается в виде отдельных очагов, советуем держаться подальше от такого сена.

Как спасти кролика от вздутия и ЖКС?

Если вы по каким-то причинам прозевали начальный момент остановки работы кишечника у кролика, необходимо принять экстренные меры. Каждая потерянная минута может сыграть свою роковую роль. Конечно, надёжнее всего обратиться к ветеринару, однако не всегда это возможно (по разным причинам), да и время можно упустить. Жизнь кролика может угаснуть уже через несколько часов. Далее мы перечислили действенные меры, часто приносящие положительные результаты и позволяющие выкрутить в сложной ситуации. Итак приступим:

1. Первое, что я всегда советую в подобных случаях, это срочно, но очень осторожно достать больного кролика из клетки и выпустить попрыгать, если он ещё на это способен, слегка погонять его. Причём лучше взять в дом, где он будет под постоянным присмотром, там он будет тратить меньше сил на обогрев тела (или наоборот на охлаждение). Грелку

применять категорически нельзя, поскольку дополнительное тепло ещё больше ускорит процесс брожения.

2. Следующий момент, это применение Эспумизана, который способствует уменьшению газов, частично снимет боль и предотвратит возможный разрыв кишечника. Детский Эспумизан продаётся в обычных аптеках. Если вдруг у вас не оказалось данного лекарства в аптечке, то купить его можно даже ночью в дежурной аптеке, что немаловажно. При помощи шприца с насадкой или пипетки три раза через каждые три часа вводите в ротовую полость по 2 мл (но не более 20 капель на 1 кг живого веса) Эспумизана. Если же дела совсем плохи, то эту же дозу применяйте через каждый час. Для лечения взрослых кроликов иногда используют Тимпанол. Раздают его 5 раз в сутки в количестве 0,4 мл с добавлением 4 частей воды на 1 часть лекарства. В дополнение к Эспумизану применяйте по несколько (до 10 капель) растительного масла. Оно одновременно способствует выходу газов, смазывает кишечник и является дополнительным питанием. Некоторые специалисты советуют касторку.

3. Далее необходимо уменьшить страдания животного от боли, которая сама по себе может стать причиной летального исхода. Обычно ветеринары прописывают Но-Шпу в виде инъекций по 0,2 мл/кг 2-3 раза в день. С успехом можно применять и другие обезболивающие средства, например Кетонал. Важно не переборщить с ними, так как спазмолитики могут полностью и окончательно уничтожить последние признаки функционирования кишечника.

4. Кстати заставить его снова работать и избавиться от газов отлично помогает периодический (через час-два) массаж живота. Для этого нужно положить животное на колени или поставить на стол. Далее осторожно, не причиняя сильной боли, но с определённым надавливанием проводите поглаживание от шеи к хвосту. Данную операцию проводите в течение 5 — 10 минут, но сразу уменьшайте давление или совсем прекращайте, если кролик продемонстрирует, что ему больно.

5. Теперь самое время позаботиться о поддержании сил животного, которое уже много часов ничего не ело, не пило и находится в обессиленном и обезвоженном состоянии. Да и как оно могло есть, если ему уже и белый свет не мил? Можно пойти самым лёгким и проверенным путём, вколоть глюкозу. И это будет правильным и оправданным шагом. Именно так и поступает большинство специалистов по лечению животных. (Физраствор, уколы по 10мл/кг 2-3 раза в день, смешивать с 5% глюкозой 1:1).

6. При умеренном вздутии кролик всё же может питаться, однако его следует посадить на строжайшую диету. Сначала вообще не кормите часов 10-15. Только понемногу воды. Никаких фруктов и овощей, даже зерно противопоказано. Разрешается кормить только качественным сеном. Воду лучше заменить остывшим ромашковым отваром (чаем) или отваром на основе сена, по 50 мл вначале, затем постепенно увеличивать норму. Это сказывается очень благоприятно.

Дополнительно снять болевые ощущения помогут наряду с ромашкой так же мята, Melissa. И лишь при заметной нормализации моторики кишечника, исчезновении вздутия можно постепенно вводить тёртую морковь, а через пару дней и другие фрукты. При резком возобновлении обычного питания рецидив как правило повторяется.

7. Необходимо учесть, что после болезни и лечения микрофлора кишечника кролика (набор полезных бактерий, способствующих пищеварению) нарушена. Посоветуйтесь с ветеринаром или узнайте в ветаптеке, какие препараты есть в наличии. Мы в основном используем Ветом, он не вызывает побочных явлений. Йогурты тут не подойдут, поскольку кролики — вегетарианцы. Насильственное применение йогуртов может навредить.

Кратко о профилактике вздутия при ЖКС

- Постоянный контроль за животными;
- Правильное сбалансированное кормление;
- Чистая вода;
- Постепенный переход к новым кормам;
- Регулярный выгул и просторные клетки;
- Включение периодически в рацион полны горькой, укропа, ромашки, - одуванчика (зимой в сушёном виде) или их отваров;
- Удаление пуха при выходе крольчат из гнезда;
- Контроль за качеством сена и других кормов;
- Постоянная селекционная работа;
- Дозированное применение лекарств, особенно антибиотиков.

На последнем пункте остановимся подробнее. В последние годы в ряде крупных хозяйств, особенно в Европе, отмечено увеличение количества случаев нарушения пищеварения у кроликов. Был проведен тщательный анализ причин такого явления. Выяснилось, что виной всему применение с целью профилактики различных антибиотиков, как в чистом виде, так и в качестве добавки к комбикормам. Частое и бездумное применение лекарств изуродовало иммунную систему кроликов. Через несколько поколений стали появляться особи, не способные самостоятельно выиграть битву с различными инфекциями, в том числе и кишечными. Покупая комбикорма или гранулы, обязательно поинтересуйтесь о наличии в них возможных биологических добавок!

Вывод

ЖКС кроликов поддаётся лечению, особенно диагностированный на ранней стадии. Если даже у вас нет возможности применить весь перечисленный выше арсенал средств и мероприятий, примените хотя бы простейшие из них. Часто даже голодная диета, массаж, пробежки-припрыжки по комнате, да полторы чайные ложки подсолнечного масла спасали раздутого кролика. А если ещё найдётся и Эспумизан, то вообще замечательно.

Источник: <http://pokcer.ru>

Мясо. Почём покупаем?

З а то время, что существует это печатное издание, обзор рынка мяса, если не изменяет память, будет впервые. Нет, это вовсе не значит, что мы не интересуемся этим сегментом рынка. Сотрудники отдела информационно – аналитического еженедельно проводят мониторинги цен на мясо свинины, согласно расписанию пишут обзоры для других наших печатных и электронных изданий. А некоторые результаты нашей работы вы можете посмотреть на нашем сайте здесь <http://www.kaicc.ru/analitika-arhiv>. Так что механизм вполне наработан, видно просто подошло время расширять поле деятельности и на страницах «Вестника информационно-консультационной службы».

Начнём издавать. С того, что происходит с начала 2014 года в стране в целом. Тут всё хорошо. Согласно сообщением Государственной службы статистики в начале нынешнего года, реализация мяса в нашей стране увеличилась по сравнению с началом прошлого года на 8,6% до 318,5 тыс. тонн.

В январе 2014 года реализация мяса скота и птицы в живом весе увеличилась на 8,6 %, или на 25,3 тыс. тонн, по сравнению с январем 2013, и составила 318,5 тыс. тонн. Реализация мяса в индивидуальных хозяйствах увеличилась на 2,3 %, или на 3,5 тыс. тонн, до 154,9 тыс. тонн. Сельскохозяйственные предприятия увеличили реализацию мяса на 15,4 %, или на 21,8 тыс. тонн, до 163,6 тыс. тонн.

Минсельхоз России сообщает также хорошие новости – страна стала меньше зависеть от импорта.

Россия с начала года снизила импорт мяса на 27,1%, до 159,1 тыс. тонн (без учета поставок из Белоруссии и Казахстана). Поставки говядины снизились на 35,2%, до 49,7 тыс. тонн, свинины - на 19,8%, до 64,1 тыс. тонн, мяса птицы - на 27,1%, до 45,3 тыс. тонн. Средние контрактные цены на говядину снизились на 5,8%, до \$4 216 за тонну (152,9 тыс. рублей). На свинину - повысились на 0,4%, до \$3 443,9 за тонну (124,7 тыс. рублей), на мясо птицы - понизились на 6,2%, до \$1429,7 (51,8 тыс. рублей).

Кроме того, Минсельхоз заявил, что в текущем году отобрано 28 региональных программ по развитию мясного скотоводства для финансирования из федерального бюджета. Опыт их реализации показывает, что это является действенным механизмом стимулирования развития мясного скотоводства. Объем средств федерального бюджета, предусмотренный на эти цели, в текущем году составляет 1 млрд. 900 млн. рублей. Средства региональных бюджетов, предусмотренных к финансированию отобранных программ, составляют 1 млрд. 700 млн. рублей. Также планируется привлечение более 24 млрд. рублей инвестиционных средств на развитие мясного скотоводства.

Ценовая информация по РФ на примере свинины сведена в таблицу, города выбраны произвольно.

Цена на свинину отечественную в городах РФ (руб/кг)

Город	11.03.2014	17.03.2014	24.03.2014	31.03.2014	07.04.2014	14.04.2014
Москва	320,18	322,18	333,18	328,68	333,98	333,40
Мурманск	220,90	221,30	221,30	221,60	221,60	221,60
Анадырь	373,33	373,33	373,00	373,00	373,00	370
Хабаровск	270,89	271,02	270,79	276,81	275,73	273,52
Благовещенск	283,03	285,10	288,77	289,43	286,43	291,10
Владикавказ	220,56	219,89	219,55	219,81	220,08	220,95
Белгород	196,00	196,00	200,00	201,00	204,00	207,84
Псков	197,70	198,40	198,40	198,40	196,58	197,24
Калининград	193,74	198,16	198,59	199,85	199,33	215,43

Представленные в таблице цены – цены реализации. Т.е. почём можно купить одно кило в магазине или на рынке. Последние полученные цифры по России показывают рост цен. В среднем можно отметить рост в пределах +1-2 руб./кг, вне зависимости от территориального признака.

Если смотреть более целенаправленно на Краснодарский край, по состоянию на 10 апреля в сельскохозяйственных предприятиях количество не осеменённых коров составляет 30,9 тыс. голов (в 2013 г – 33,6 голов). Осеменённых повторно – 7,2 тыс. голов. Гинекологических больных всего 5,8 тыс. голов (в 2013 г – 6,6 тыс. голов).

По случке и осеменению коров с начала месяца выполнено 36% (4,4 тыс. голов) от намеченного объема ра-

бот на апрель, это на 0,1 тыс. голов больше чем в прошлом году на отчетную дату. По случке и осеменению телок, с начала месяца выполнено 43% (2,0 тыс. голов) от намеченного объема, это на 0,3 тыс. голов больше чем в прошлом году на отчетную дату.

По случке и осеменению свиней, с начала месяца выполнено 47% (1,9 тыс. голов) от намеченного объема, в том числе свинок – 0,4 тыс. голов, это на 0,4 тыс. голов больше чем в прошлом году на отчетную дату.

Валовой надой молока (все категории хозяйств, без ЛПХ) на этой неделе по краю составляет 2471,4 т (-0,3 т за неделю). Суточный удой составил – 17,2 кг (в 2013г. – 15,8 кг).

Юридическая и законодательная информация не частый гость в наших статьях, поэтому при первой возможности стараемся уведомить о том, что соответствует тематике наших аналитических изысканий. В этот раз, таким сообщением будет то, что власти Краснодарского края в 2014г. выделяют 53,55 млн. руб. на возмещение части затрат фермерам, пострадавшим от африканской чумы свиней (АЧС). Об этом сообщается в постановлении губернатора региона Александра Ткачева. В текущем году аграриям края будет возмещаться до 25% затрат за сдачу биологических отходов на утилизацию. В 2015г. на эти цели планируется выделить 54,83 млн. руб. Всего за период 2012-2015гг. на возмещение фермерских затрат по ликвидации последствий АЧС будет выделено 122,63 млн. руб.

По данным администрации, свиноводческая отрасль Кубани из-за вспышек АЧС потеряла 266 тыс. голов свиней. В 2012г. в крае производство свинины упало примерно на 30%: было произведено 56 тыс. тонн против 73,1 тыс. тонн годом ранее. При этом по данным краевого Минсельхоза, потребность региона в продукте составляет 77 тыс. тонн.

Средние цены на мясо по Краснодарскому краю по состоянию на 1 марта 2014г:

Наименование продукции	Руб./тонна		
	Минимальная цена	Максимальная цена	Цена большинства
Продукция КРС			
Цена реализации производителей с/х продукции			
КРС (в убойном весе)			
- выше средней упитанности	152 475,00	177 460,00	164 967,00
- средней упитанности	145 000,00	160 200,00	152 600,00
- ниже средней упитанности	104 203,00	104 203,00	104 203,00
Продукция свиноводства			
Свиньи (в убойном весе)			
- II категории	112 000,00	126 000,00	118 500,00
Мясо птицы			
Цена производства			
Мясо кур I категории, включая	78 000,00	115 321,00	96 500,00
Окорочка куриные отечественные	91 000,00	96 000,00	93 000,00
Говядина			
Потребительская цена			
Говядина I категории (отечественная)	241,78	281,11	261,67
Говядина II категории (отечественная)	214,44	248,89	231,67
Свинина			
Свинина II категории (отечественная)	206,79	244,75	225,77
Свинина III категории (отечественная)	180,00	220,00	200,00
Мясо птицы			
Мясо кур I категории, включая	106,27	124,20	115,25
Окорочка куриные (отечественные)	96,12	111,82	103,84

Согласно данным МСХ РФ по состоянию на 14.04.2014 года, потребительские цены на свинину отечественную (руб/кг) в городе Краснодар и в административных центрах регионов, граничащих с Краснодарским краем выглядят следующим образом:

Город	03.03.2014	11.03.2014	17.03.2014	24.03.2014	31.03.2014	07.04.2014	14.04.2014
Краснодар	256,40	256,40	256,40	256,40	256,10	256,10	256,10
Майкоп	216,32	216,03	216,03	215,84	215,31	212,91	211,70
Ставрополь	220,00	220,00	220,00	220,00	224,00	224,00	225,80
Ростов-на-Дону	265,30	266,09	265,02	264,42	264,42	264,42	264,42

Данные мониторингов МСХ РФ в отношении ЮФО показывают изменения в республике Адыгее, где цены понизились в среднем на 2 рубля. Ставропольский край, напротив, показывает на 2 рубля увеличение. Остальные субъекты остались без изменений. В рознице, в крупных магазинах в г. Краснодаре, наблюдается рост цен на все виды свинины. В среднем, рост фиксируется в пределах 10 руб./кг.

Материалы подготовлены специалистами
ГБУ КК "Кубанский сельскохозяйственный ИКЦ"